


Evaluation de l'état de conservation des tourbières

Les indicateurs fournis dans cette fiche vous permettent d'évaluer l'état de conservation de votre tourbière à partir de la végétation présente. Cette évaluation met en évidence les éventuelles dégradations existantes sur le site pour lesquelles il sera peut-être nécessaire d'intervenir (travaux de restauration, aménagements pastoraux, ajustement des pratiques agricoles...).

La première question à se poser est : suis-je dans une tourbière haute ou dans un bas marais acide ? Pour y répondre, reportez vous à la fiche technique Tourbière haute ou bas marais acide. Évaluez ensuite à partir de la végétation présente dans quelle classe : « bonne, moyenne ou défavorable » se trouve votre milieu ! L'objectif étant d'aboutir à un bon état de conservation, à vous de juger si des modifications de gestion sont à prévoir !

Evaluation de la structure du milieu pour les tourbières hautes et les bas marais acides



Cet outil se veut rapide et simple d'utilisation ; le Conservatoire reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant la gestion de votre zone humide. N'hésitez pas à nous contacter !

Evaluation de la composition floristique du milieu

Tourbière haute

- Recouvrement des herbacées en touffes (Molinie bleue, Nard raide) <20%.
- Recouvrement en espèces exotiques (Epicéa, Pin à crochet) <1%.
- Absence de recouvrement par les chardons, oseilles ou orties.

- Recouvrement des herbacées en touffes (Molinie bleue, Nard raide) de 20 à 40%.
- Recouvrement en espèces exotiques (Epicéa, Pin à crochet) de 1 à 10%.
- Recouvrement par les chardons, oseilles ou orties <1%.

- Recouvrement des herbacées en touffes (Molinie bleue, Nard raide) >40%.
- Recouvrement en espèces exotiques (Epicéa, Pin à crochet) >10%.
- Recouvrement par les chardons, oseilles ou orties >1%.

Graminée en touffes

Espèce exotique

Ortie

Bon

Moyen

Défavorable

Bas marais acide

- Recouvrement des herbacées en touffes (Canche cespiteuse, Molinie bleue, Nard raide) <20%.
- Absence de recouvrement par les chardons, oseilles ou orties.

- Recouvrement des herbacées en touffes (Canche cespiteuse, Molinie bleue, Nard raide) de 20 à 40%.
- Recouvrement par les chardons, oseilles ou orties <1%.

- Recouvrement des herbacées en touffes (Canche cespiteuse, Molinie bleue, Nard raide) >40%.
- Recouvrement par les chardons, oseilles ou orties >1%.

Dégradations observables sur tourbière haute ou bas marais acide

- Superficie impactée par une dégradation (buttes déstructurées, piétinement, dépôts, drains, feu, passages d'engins, captage d'eau...)

<1% : Bon

de 1 à 10% : Moyen

>10% : Défavorable

CDSL
5 bis, impasse Félix Remise
48000 Mende
04 66 49 28 78
cdsl@wanadoo.fr

